n°. 153

Observations

qu'a l'honneur de Communiquer à L'accademie Royalle de Chirurgie J. J. Belloc m.e ez-arts, Lieutenant de M. le Premier chirurgien du Roy à Agen.

observation
Sur une hernie de Vessie

En 1764 on me fit voir un enfant de six mois qui avoit une tumeur à l'aine droite qui descendoit jusques au fond du scrotum. En la maniant pour m'assurer de son caractere, l'enfant urina et elle se detendit assés sensiblement. à ce seul signe j'aurois deu reconnoitre une hernie de vessie si mens non laeva fuisset; mais j'avoue ma faute, ou plutot mon ignorance, je la pris pour un hydrocele. La cause de mon erreur avoit une double source: d'un coté j'etois prevenu que cette derniere incomodité etoit tres familiaire aux enfans de cet age et de l'autre c'est que je me rapelai point d'avoir jamais entendu parler de hernie de vessie: tant il est vrai que les fautes nous instruisent souvent plus que les succés et les leçons les plus savantes.

Dans mon idée je proposai l'operation et craignant la recidive si je me contentois de faire une simple ponction, je me decidai pour l'incision dans toute la longueur de la tumeur. autre faute qu'on ne doit me pardonner qu'à raison de mon peu d'experience; en effet j'etois jeune. Depuis ce tems là j'ai appris que chés les enfans de cet age la seulle ponction secondée de fomentations aromatiques et legerement adstringentes suffit presque toujours.

à Peine eus je fait l'incision que je connus mon erreur. que devois je faire dans ce moment? tacher d'y remedier, la cacher et en rougir dans le secret et l'amertume de mon ame.

J'examinai bien l'etat des choses. Je trouvai la portion de

ARC 15 d. 56 ?

la vessie qui formoit la tumeur, adherente dans toute son étendue aux parties circonvoisinnes et l'étranglement formé par l'aneau permettoit à peine l'introduction d'une sonde à femme.

J'appliquai d'abord un premier appareil à l'ordinaire, me reservant de reflechir sur ce qui conviennoit de faire pour parvennir à la consolidation de la playe et pour eviter un trou fistuleux que je craignois beaucoup, suposé que l'enfant survecut à cette operation.

Dans ces vuës je me proposai d'agacer la circonference interieure de l'etranglement afin d'y exciter une legere phlôgose pour faciliter l'obturation du trou par l'adherence de ses parois ; mais avant d'en vennir à ces moyens, je voulus attendre quatre ou cinq jours afin de donner à cette machinne frele et tendre le tems de se remettre de l'ebranlement que lui avoit causé cette operation.

Je mis en usage une decoction aromatique au vin legerement animée avec l'eau de vie dont j'imbibois un plumaceau fort épais et j'excitai une suppuration dans le reste de la playe par le moyen d'un digestif simple. ces pancemens feurent continués l'espace de quinze jours : pour lors m'apercevant que la playe commençoit à cicatriser, je me contentai de panser simplement avec la charpie seche. J'eus toujours le soin de mettre sur l'étranglement un plumaceau epais afin d'empecher l'urine de sortir par là et j'en secondai l'effet par la situation courtante sur le dos que je fis garder au petit malade, et j'eus la douce satisfaction de voir cette ouverture entierement fermée au bout d'un mois et quelques jours.

Cet enfant bien gueri eut, environ deux mois aprés sa guerison une fievre continue dont il mourut : mais il est tres certain que cette operation n'influa en rien sur sa mort ; d'autant plus que pleusieurs autres enfans moururent dans ce même tems d'une fievre qui regnoit epidemiquement dans ce païs